

Conduite à tenir en cas de pique d'hyménoptère chez l'enfant

Après une ou plusieurs piqûres, il est important de reconnaître les situations nécessitant une hospitalisation urgente.

1. Réaction locale habituelle

La piqûre est le plus souvent bénigne. Elle entraîne une douleur locale mais la rougeur et le gonflement au niveau de la piqûre sont des conséquences normales qui vont s'atténuer progressivement.

→PROCEDURE :

- Appliquer une source de froid pour agir sur l'aspect inflammatoire provoqué par la piqûre.
- Consigner ce soin au registre spécifique (nom de l'élève ayant bénéficié de soins, date et heure de l'intervention, mesures de soins et d'urgence prises, éventuelles décisions d'orientation de l'élève ...) et informer la famille des soins apportés ou décisions prises.

Exemple de registre de soins : <http://www.ia72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/prevention-et-securite/organisation-des-soins-et-des-urgences-dans-les-ecoles--686136.kjsp?RH=1504083731300>

2. Situations urgentes

Dans les cas de figure suivants :

- Piqûre oculaire /
- Piqûres des voies aériennes
- Piqûres multiples
- Réactions allergiques de type rougeurs diffuses, grattements intenses, œdème de la peau, difficultés respiratoires, hyperthermie, troubles moteurs, tachycardie, pâleur, malaise, nausées, vomissements...
- Antécédent du sujet avec hypersensibilité connue avec un PAI

Bien réagir en dehors de toute urgence :

-En cas de piqûre à la main, ôtez les bagues

→CONTACTER IMMEDIATEMENT le 15

Bien réagir en situation d'urgence :

-Lors de l'appel, soyez calme et clair. Donner votre numéro de téléphone, votre nom et celui de la personne concernée. Indiquer l'adresse exacte et prévoir une personne pour accueillir les secours. Décrire le plus précisément les signes qui vous ont alerté. Ne raccrocher pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande.

-En attendant les secours, rester calme et rassurer la victime

-Les personnes conscientes seront de préférence allongées sur le dos avec les jambes relevées mais en position assistée si elles présentent des difficultés respiratoires. Les personnes inconscientes seront allongées en PLS.

Dans le cas d'une réaction allergique grave, l'école qui dispose d'un kit prêt à l'emploi type seringue ANAPEN* pourra, APRES ACCORD du SAMU, être amené à administrer ce produit avant l'arrivée des secours.

**Ces produits sont des médicaments à ce titre, ils ne peuvent être disponibles sur l'école que dans le cadre d'un PAI.*